

# Auswirkungen von IC/PBS (Interstitial Cystitis/ Painful Bladder Syndrome) auf die sexuellen Funktionen und Partnerschaften von Patientinnen

Dara S. Lazar – Hanusch-Krankenhaus, Urolog. Abt., Wien  
Lukas K. Daha, H. Pflüger - Urolog. Abt., Krankenhaus Hietzing, Wien  
Statistik: Markus Triska, B.Sc.  
Internetsponsoren:  
ICA-Deutschland e. V.,  
Ludwig-Boltzmann-Institut für Andrologie u. Urologie Wien

# Methode der Studie

Erhebung durch **Online-Befragungen**  
**auf den Websites:**

- ❖ ICA-DEUTSCHLAND e. V. -  
Förderverein Interstitielle Cystitis  
<http://www.ica-ev.de/>
- ❖ The Cystitis and Overactive Bladder  
Foundation  
<http://www.cobfoundation.org/>

# Fragebogen

entwickelt am Universitätsklinikum Charité der Freien und der Humboldt Universität Berlin

Inhalte:

- ❖ Alle Aspekte sexueller Funktionsstörungen und Partnerschaftsbeziehungen
- ❖ Soziale Variablen
- ❖ Differenzierung in Zeitebenen: *Vor der Erkrankung - Nach Ausbruch der Krankheit - Mit Therapien* (ergänzt von D. S. Lazar)
- ❖ Insgesamt wurden 137 Punkte abgefragt.

# Ergebnisse der Studie

- ❖ Beantwortung durch 78 deutsche und 37 englische Patientinnen (17 - 72 Jahre)
- ❖ Kontrollgruppe: 87 gesunde Frauen (Fragebogen um die krankheitsspez. Punkte bereinigt)
- ❖ Kein signifikanter Unterschied bei englischen und deutschen Ergebnissen
- ❖ Keine signifikanten Unterschiede aufgrund des kulturellen Hintergrundes, Bildungsstandes und der Religion

# Fragenkomplex: Sexuelle Lust 1

## **Vor der Krankheit**


- ❖ Geringe sexuelle Lust herrscht vor allem bei Frauen in der Menopause oder danach vor.

## **Nach Ausbruch der Krankheit**

- ❖ Es zeigt sich ein signifikanter Anstieg von sexueller Lustlosigkeit auch bei Patientinnen unter 50 Jahren.

# Fragenkomplex: Sexuelle Lust 2

*Fragestellung: Wie oft haben Sie den Wunsch sexuell aktiv zu sein?*



# Fragenkomplex: Sexuelle Aktivität



## **Nach Ausbruch der Krankheit**

- ❖ In allen Altersgruppen gehen sexuelle Aktivitäten mit Partnern beträchtlich zurück.
- ❖ Erregungs- und Orgasmusstörungen sowie Schmerzen beim Geschlechtsverkehr nehmen in allen Altersgruppen signifikant zu.

# Auswirkungen von Therapien

Angewendete Therapien für IC/PBS zeigten keine signifikanten Verbesserungen der Sexualstörungen.

*Fragestellung: Wie oft haben Sie den Wunsch sexuell aktiv zu sein?*



# Fragenkomplex: Partnerschaft

- ❖ Die Partnerbeziehungen bleiben trotz Krankheit und Sexualstörungen eng.
- ❖ Trennungsgedanken treten nicht häufiger auf als in der Kontrollgruppe.
- ❖ ***Die allgemeine Lebenszufriedenheit ist jedoch bei der Kontrollgruppe signifikant höher als bei den Patientinnen - selbst vor Ausbruch der Krankheit.***